

VEXETACIÓN DA LAGOA DE SOBRADO

Zona húmida de importancia europea



Menyanthes trifoliata. TREBO DE AGUA
Sítúase nas beiras da lagoa.
Florece de abril a xuño.



Baldellia ranunculoides. ALISMA
Atópase nas beiras da lagoa. Florece na primavera e no verán.



Salix sp. SALGUEIRO
Árbore caducifolia que enraíza moi ben nas beiras da lagoa.
Diferéncianse árbores masculinas e femininas.



Alnus glutinosa. AMENEIRO
É a árbore más abundante que forma a "galería" da lagoa e dos regatos que desembocan nela.



Potamogeton natans. ESPIGA DA AUGA
Enraíza a máis profundidade ca o ambroíño en augas tranquilas. Florece a partir de xuño.



Miriophyllum alterniflorus. FILIGRANA
Atópase no medio da lagoa enraizando a uns tres metros de profundidade. Florece entre xuño e agosto.



Eleocharis palustris. ELEOCHARIS
Enraíza nas beiras da lagoa.
Florece de maio a agosto.



Nitella flexilis. ALGA
Enraíza na zona más profunda da lagoa.



Sparganium erectum. PLATANARIA
Enraíza nas beiras da lagoa.
Florece de xuño a agosto.



Utricularia vulgaris. LENTIBULARIA
Planta carnívora que aboa sen enraizar.
Florece entre xuño e agosto con vistosas flores amarelas.



Juncus effusus. XUNCO DAS ESTEIRAS
Atópase nas beiras da lagoa. Florece entre xuño e setembro.



Nymphaea alba. AMBROÍÑO DE RÍO
Planta acuática típica de augas tranquilas.
Enraíza no fondo da lagoa a un metro de profundidade. Florece a partir de xuño.