



Lycopodiella inundata (*Lycopodiella inundata*)



NOME COMÚN

Lycopodiella inundata

NOME CIENTÍFICO

Lycopodiella inundata

CLASE

Fentos

FAMILIA

Lycopodiaceae

DESCRICIÓN

Fieito caracterizado por presentar cauloides rastreiros ou rizomas profusamente revestidos de pequenas follas duns 5 mm de lonxitude, non divididas e de cor verde amarela, dispostas en espiral. A súa morfoloxía fai que sexan confundidos, as máis das veces, con brións.

Os cauloides poden estenderse polo chan e conseguir os 20 cm de lonxitude. Deles emerxen xemas erectas.

REPRODUCCIÓN

Na parte apical dos gromos aparecen os soros, receptáculos onde se producen e gardan as esporas, células xerminativas características dos fieitos. Maduran entre os meses de xullo e setembro.

HÁBITAT

Reside en zonas de turbeira, pantanos, lugares encharcados, sempre en solos ácidos en ambiente con breixos e carqueixa.

DISTRIBUCIÓN

Encóntrase moi localizado en certos puntos das provincias de Lugo e Ourense caracterizados polo seu asolagamento temporal.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Moi sensible aos efectos producidos polo gando en réxime de semiliberdade e polas infraestruturas derivadas da posta en funcionamento de parques eólicos (camiños, estradas, áreas erosivas...).

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

En *perigo de extinción*.